

### Connect Hartfalen Protocol 5A: Medische overdracht palliatieve fase hartfalen

Naam:	Geboortedatum:
Adres:	Telefoonnummer:
Woonplaats:	Postcode:
Contactpersoon:	BSN:
Verzekering:	Nummer:

Over bovengenoemde patiënt hadden wij op ..-.-.... telefonisch contact.

Met patiënt is besproken dat er wordt gedacht aan **palliatieve fase van het hartfalen** vanwege het voorkomen van de volgende symptomen:

	aanwezig
Progressieve fysieke en/of mentale achteruitgang en ADL afhankelijkheid	
Ernstige hartfalen symptomen met verslechterende levenskwaliteit ondanks beschikbare therapeutische behandeling	
Frequente ziekenhuisopnames of andere ernstige episodes van hartfalen ondanks optimale behandeling	
Uitgesloten zijn van mogelijkheden van therapie zoals: harttransplantatie en ondersteunende mechanische circulatie	
Cardiale cachexie	
Klinische beoordeling van het naderend levenseinde	

#### Afspraken met patiënt vanuit Ziekenhuis:

- Gesprek met patiënt over de overdracht aan de huisarts(praktijk)
- Behandeling wordt én telefonisch én schriftelijk overgedragen aan de huisarts
- Van ziekenhuisopnames worden in principe door patiënt afgezien
- Symptomatische palliatieve behandeling door de huisarts
- Huisarts stelt samen met POH in een schakelconsult een zorgplan op samen met patiënt en zijn naasten
- Huisarts zorgt voor overdracht naar thuiszorgorganisatie en huisartsenpost
- Wensen en behoeften patiënt en naasten wel/ niet besproken ja/nee

- Zingevingsvragen wel/ niet besproken. ja/nee
- Met patiënt is wel / niet reanimeren besproken ja / nee
- Een Niet-Reanimeren verklaring is toegevoegd ja / nee
- Recept nood medicatie is meegegeven aan de patiënt ja / nee
- Patiënt heeft uitleg gebruik noodmedicatie gekregen ja / nee
- Heeft patiënt een ICD ja / nee
- Indien patiënt een ICD heeft: ICD is uitgeschakeld voor ontslag naar huis ja / nee

**Medicatie bij ontslag/ overdracht**

.....

.....

.....

.....

**Aandachtspunten**

*Porth a cath: Mocht u blijvende intraveneuze therapie met diuretica overwegen dan kunt u ons benaderen voor het plaatsen van een porth a cath.*

De ICD (implanteerbare defibrillator) shockfunctie kan op verzoek uitgezet worden; daartoe kunt u contact opnemen met de het ICD implanterend centrum. Op het ICD -PM pasje van de patiënt staat of het ICD of een pacemaker betreft, tevens staat de naam van het ziekenhuis en de firmanaam op dit pasje.

**Documenten en telefoonnummers:**

- Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de hartfalenpolikliniek of de dienstdoende cardioloog.
- Consultatieteam Palliatieve Zorg Hollands Midden inschakelen (088-1232451, werkdagen 09.00 – 17.00)

**Richtlijnen behandeling palliatief hartfalen**

Behandeling klachten in de laatste 6 maanden: Zie [www.pallialine.nl](http://www.pallialine.nl)

Voor de palliatieve behandeling van ernstige benauwdheid geldt als regel :

Diuretica (ophogen)

Morfine Twee maal dd 20 mg slow release per os

6 maal dd 2,5-5 mg sc

15-30 mg/24 uur sc/iv (pomp)

NTG-spray (evt te combineren met morfine)

**Bijzonderheden bovengenoemde patiënt:**

.....

.....

.....

.....

.....